

Aktuell

aus Ihrer

← **west**
APOTHEKE



Unsere Angebote im Mai & Juni:

Gute Reise! Füllen Sie bei uns Ihre Reiseapotheke auf!

Voltaren® Schmerzgel forte
Entzündungshemmendes, schmerzlinderndes Arzneimittel zum Einreiben



100 g Gel, statt € 22,18*

Paracetamol-ratiopharm® 500 mg**
Bei Fieber und Schmerzen



20 Tabletten, statt € 3,70*

Cetirizin Aristo® bei Allergien 10 mg
Zur Behandlung allergischer Reaktionen



50 Filmtabletten, statt € 6,96*

Imodium® akut
Bei akutem Durchfall



12 Hartkapseln, statt € 10,50*

Tromcardin® complex, zur diätetischen Behandlung von Herzerkrankungen, insbesondere Herzrhythmusstörungen



120 Tabletten, statt € 29,95*

Tebonin® intens 120 mg, zur Leistungsstärkung des Gehirns und zur Durchblutung



60 Filmtabletten, statt € 56,70*

VIGANTOL® 1000 I.E.
Vitamin D3 Tabletten



100 Tabletten, statt € 8,98*

FeniHydrocort® Creme 0,5%, bei mäßig ausgeprägten entzündlichen Hauterkrankungen



30 g Creme, statt € 16,40*

Bepanthen® Wund- und Heilsalbe
Bei Wunden und geschädigter Haut



50 g Salbe, statt € 12,59*

ANTI BRUMM® forte
Hält wirkungsvoll Stechmücken und Zecken fern



75 ml Pumpspray, statt € 11,95*

Cetaphil® Daylong™ SUN Liposomale Lotion SPF 30, bei trockener, empfindlicher Haut



200 ml Lotion, statt € 29,95*

Eucerin® UreaRepair Plus Fußcreme 10 %, für extrem trockene, raue Füße



100 ml, statt € 12,45*

* Eigener ehemaliger Verkaufspreis innerhalb der letzten 30 Tage vor der Preisermäßigung ** Bei Schmerzen und Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage angegeben! Bild: © Sunny studio & © aey/stock.adobe.com Gültig vom 01.05. – 30.06.2024 - Stand: 01.05.2024

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Voltaren Schmerzgel forte 23,2 mg/g Gel Wirkstoff: Diclofenac-N-Ethylethanamin. Anwendungsgebiete: Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren: Zur lokalen, symptomatischen Behandlung von Schmerzen bei akuten Prellungen, Zerrungen oder Verstauchungen infolge eines stumpfen Traumas, z. B. Sport- und Unfallverletzungen. Bei Jugendlichen ab 14 Jahren ist das Arzneimittel zur Kurzzeitbehandlung vorgesehen. Warnhinweis: Enthält Propylenglycol, Butylhydroxytoluol und einen Duftstoff mit Eukalyptus, Benzylalkohol, Citronellol, Cumarin, D-Limonen, Eugenol, Geraniol und Linalool. Apothekenpflichtig. Stand: 10/2022. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, 80339 München; **Paracetamol-ratiopharm® 500 mg Tabletten.** Wirkstoff: Paracetamol. Anwendungsgebiete: Leichte bis mäßig starke Schmerzen, Fieber. Warnhinweis: Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben! AM enth. weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro Tbl., d. h. es ist nahezu „natriumfrei“. Apothekenpflichtig. Stand: 10/21. ratiopharm GmbH, D-89079 Ulm; **Cetirizin Aristo® bei Allergien, 10 mg Filmtabletten, Cetirizin Aristo® bei Allergien, 10 mg Filmtabletten** Wirkstoff: Cetirizindihydrochlorid. Filmtabl.: Kdr. ab 6 J. u. Erwachs.: Behandlung v. Krankheitszeichen (Symptomen) bei allerg. Erkrankungen wie chron. Nesselsucht (Urtikaria) (mit z. B. Juckreiz, Quaddelbildung, Haut-Rötung); chron. allerg. Schnupfen; Juckreiz bei Nesselsucht (Urtikaria) u. atopischer Dermatitis (Neurodermitis) mit Beschwerden wie Rötung der Haut; Heuschnupfen (mit z. B. Niesen, Nasenlaufen, Nasenjucken, Nasenverstopfung, Rötung bzw. Jucken der Augen u. Tränenfluss); z. Unterstützung b. asth-

moiden Zuständen allerg. Herkunft. Enthält Lactose. Packungsbeilage beachten. Apothekenpflichtig. (Stand November 2023). Aristo Pharma GmbH, 13435 Berlin; **Imodium® akut**, Wirkstoff: Loperamidhydrochlorid. Anwendungsgebiete: Symptomatische Behandlung von akuten Durchfällen für Erwachsene u. Jugendliche ab 12 Jahren, sofern keine ursächliche Therapie zur Verfügung steht. Eine über 2 Tage hinausgehende Behandlung nur unter ärztlicher Verordnung u. Verlaufsbeobachtung. Warnhinweis: Hartkapsel enthält Lactose. Johnson & Johnson GmbH, 41470 Neuss. Stand: 03/2022; **Tebonin® intens 120 mg** Wirkstoff: Ginkgo-biloba-Blätter-Trockenextrakt. Anwendungsgebiete: Zur symptomatischen Behandlung von hirntrophisch bedingten geistigen Leistungsstörungen im Rahmen eines therapeutischen Gesamtkonzeptes bei fortschreitender Abnahme bzw. Verlust erworbener geistiger Fähigkeiten mit den Hauptbeschwerden: Gedächtnis-/Konzentrationsstörungen, Niedergeschlagenheit, Schwindel, Ohrensausen, Kopfschmerzen. Das individuelle Ansprechen auf die Medikation kann nicht vorausgesagt werden. Bevor die Behandlung begonnen wird, sollte geklärt werden, ob die Beschwerden nicht auf einer spezifisch zu behandelnden Grunderkrankung beruhen. Zur Verlängerung der schmerzfreien Gehstrecke bei arterieller Verschlusskrankheit in den Gliedmaßen, sog. „Schaufensterkrankheit“ im Rahmen physikalisch-therapeutischer Maßnahmen, insbes. Gehtraining. Bei Schwindel infolge von Durchblutungsstörungen oder altersbedingten Rückbildungsvorgängen. Zur unterstützenden Behandlung von Ohrgeräuschen infolge von Durchblutungsstörungen oder altersbedingten Rückbildungsvorgängen. Häufig auftretende Schwindel-

gefühle und Ohrensausen bedürfen grundsätzlich der Abklärung durch eine Ärztin oder einen Arzt. Bei plötzlich auftretender Schwerhörigkeit bzw. einem Hörverlust sollte unverzüglich eine Ärztin oder ein Arzt aufgesucht werden. Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG - Karlsruhe; **VIGANTOL® 1000 I.E. Vitamin D3 Tabletten.** Wirkstoff: Colecalciferol. Anwendungsgebiete: Zur Vorbeugung gegen Rachitis (Verkalkungsstörungen des Skeletts im Wachstumsalter, auch bei Frühgeborenen) und Osteomalazie (Knochenweichung bei Erwachsenen). Zur Vorbeugung bei erkennbarem Risiko einer Vitamin-D-Mangelkrankung bei ansonsten Gesunden ohne Resorptionsstörung (Störung der Aufnahme von Vitamin D im Darm) bei Kindern und Erwachsenen. Zur unterstützenden Behandlung der Osteoporose (Abbau des Knochengewebes) bei Erwachsenen. Warnhinweise: enthält Saccharose (Zucker). Stand: Mai 2019; **FeniHydrocort Creme 0,5 %** Wirkstoff: Hydrocortison. Anwendungsgebiete: Zur Linderung von mäßig ausgeprägten entzündlichen Hauterkrankungen. Warnhinweis: Enthält Cetylstearylalkohol und Kaliumsorbat. Apothekenpflichtig. Stand: 10/2020. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, 80339 München; **Bepanthen® Wund- und Heilsalbe.** Wirkstoff: Dexpanthenol. Anwendungsgebiete: Zur Unterstützung der Heilung bei oberflächlichen leichten Haut- und Schleimhautschädigungen. Hinweis: Enthält Wollwachs, Stearylalkohol und Cetylalkohol. Packungsbeilage beachten. Bayer Vital GmbH, 51368 Leverkusen.